



Accidents de la vie courante

2 avril 2013
Claire Hassen-Khodja
Interne de Santé Publique
CHRU Tours



Accidents

- Accidents de la circulation
- Accidents du travail
- **Accident De la Vie Courante (ADVC)**



Accident De la Vie Courante (ADVC)

Comment se répartissent-ils ?



ADVC : répartition

- Accidents domestiques
 - Maison et abords immédiats
- Accidents scolaires
 - Trajet, heures d'éducation physique, locaux scolaires
- Accidents de sport
- Accidents de vacances et de loisirs
- Accidents survenant à l'extérieur
 - Magasin, trottoir, ...



ADVC : épidémiologie

- Problème de santé publique
- 11 millions de personnes chaque année
 - 4,5 millions → urgences
 - > 100 000 → hospitalisations
- 3^{ème} cause de mortalité en France
 - 19 000 décès chaque année
 - 3,6 % du total des décès



ADVC : épidémiologie

- « Un décès sur cinq chez les enfants de 1 à 4 ans est dû à un accident de la vie courante »

(donnée CépiDc 2006)



ADVC : épidémiologie

- Tous milieux
- Toutes tranches d'âge
 - < 15 ans +++ : 1^{ère} cause de mortalité !
 - > 65 ans +++ : chutes
- 75 % des décès par ADVC dans ces populations



Accident De la Vie Courante (ADVC)

Quelles sont les principales causes
de décès par ADVC ?

Classement des principales causes de décès par ADVC *(Données 2006)*

1. Chutes

■ 9099 décès

2. Suffocations

■ 2848 décès

3. Noyades

■ 1008 décès

4. Intoxications

■ 1022 décès

5. Accidents par le feu

■ 496 décès



Accident De la Vie Courante (ADVC)

Quels sont les principaux lieux de survenue des ADVC ?



Classement des principaux lieux de survenue des ADVC

1. Habitat : 50 %
2. Aires de sports et de jeux : 19 %
3. Établissement d'enseignement et lieux publics : 12 %
4. Zones de transport : 11 %
5. Autres lieux : 8 %



Surveillance épidémiologique des ADVC

- **Statistiques des causes médicales de décès :**
 - Centre d'épidémiologie des causes médicales de Décès (CépiDc)
- **Enquêtes permanentes**
 - Enquête permanente des accidents de la vie courante (Epac)
- **Enquêtes multithématiques :**
 - Baromètres Santé

Enquête MAC-15

Département des maladies chroniques et des traumatismes
Institut de veille sanitaire

- Mortalité par AcVC chez les < 15 ans

- Objectif :
 - Améliorer les connaissances
 - ↳ Évaluer l'évitabilité des décès
 - ↳ Orienter les mesures de prévention
 - ↳ Réduire les décès par AcVC chez les enfants

- Objectif 93 de la loi de Santé Publique : « réduire de 50 % la mortalité par accident de la vie courante des enfants de moins de 14 ans entre 2004 et 2008 »

Enquête MAC-15

Département des maladies chroniques et des traumatismes
Institut de veille sanitaire

- Résultats :

- Décès plus importants chez les enfants < 1 an
 - Cause principale : mort subite du nourrisson

- Décès > 1 an de causes diverses
 - Dont pendaisons

Mortalité par ADVC en France métropolitaine

2000-2008

(BEH juillet 2011)


- Objectif :
 - Mesurer et caractériser les ADVC en France de 2000 à 2008

- Résultats :
 - 25,1/100 000 décès par ADVC
 - Surmortalité masculine
 - > 75 ans
 - Chutes, suffocations, noyades, intoxication et accidents par le feu
 - Diminution du taux de mortalité surtout chez < 15 ans

↪ ADVC : cause importante de décès en France


↪ Prévention + réglementation !

ADVC chez les enfants scolarisés en CM2 (2004-2005)



Bertrand Thélot, Anne-Laure Chatelus, Département des maladies chroniques et traumatismes, Institut de veille sanitaire

Les accidents de la vie courante chez les enfants scolarisés en CM2 en 2004-2005 – Synthèse — INSTITUT DE VEILLE SANITAIRE



ADVC chez les enfants scolarisés en CM2 (2004-2005)

- Sur 3 mois, 9 enfants sur 100 victimes d'un ADVC
- 1/2 des ADVC : accident de sport
- Facteurs de risque d'AcVC :
 - Enfants \geq 11 ans
 - Garçons
 - Pratique régulière sport
 - Famille de \geq 4 enfants



Mort subite du nourrisson (MSN)



Mort subite du nourrisson (MSN)

- Syn. : mort inattendue du nourrisson (MIN)
- Décès inexplicé d'un nourrisson de moins de 1 an apparemment en bonne santé
 - Lorsque l'enfant dort +++
- Principale cause de mortalité de l'enfant âgé de 1 mois à 1 an dans les pays développés
- Toute mort inattendue du nourrisson doit être explorée



MSN

- Facteurs de risque :
 - Couchage ventral ou sur le côté
 - matelas mou, couvertures et oreillers
 - Enfant trop couvert
 - Température de la pièce trop élevée
 - Tabagisme passif



MSN

Quelles sont les mesures de
prévention ?



MSN

- Recommandations :
 - Couchez le nourrisson sur le dos
 - sur une surface ferme et plate dans une « turbulette » ou « gigoteuse » adaptée à sa taille
 - Literie adaptée : évitez matelas et oreillers mous
 - Température ambiante : 19°
 - Stop tabac



MSN

- Circulaire ministérielle du 14 mars 1986 : centres de référence de la MSN dans les CHU et CHR
 1. Prise en charge de l'enfant décédé
 2. Accueil et suivi des parents
 3. Organisation de la recherche et de l'enseignement
 4. Diffusion de l'information sur la MSN



- www.prevention-maison.fr

- www.stopauxaccidentsquotidiens.fr



Je vous remercie !
